

ИНСТРУКЦИЯ

по применению иммуноглобулина поливалентного
против чумы плотоядных, парвовирусного, коронавирусного энтеритов
и аденовирусных инфекций собак «ГЛОБКАН-5»
(организация-разработчик – ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалей, д. 16)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование – ГЛОБКАН-5

Международное непатентованное наименование – Иммуноглобулин поливалентный против чумы плотоядных, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и аденовирусных инфекций собак

2. Лекарственная форма – раствор для инъекций. ГЛОБКАН-5 состоит из высокоочищенной фракции глобулинов, выделенных из сыворотки крови лошадей, иммунизированных возбудителями чумы собак, парвовирусного и коронавирусного энтеритов и аденовирусных инфекций собак.

3. По внешнему виду ГЛОБКАН-5 представляет собой бесцветную или слегка желтоватую, прозрачную или опалесцирующую жидкость. При длительном хранении допускается образование небольшого осадка, который при взбалтывании легко разбивается в равномерную взвесь. Срок годности иммуноглобулина - 2 года от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. По истечении срока годности иммуноглобулин к применению не пригоден. Иммуноглобулин необходимо использовать в день вскрытия флакона.

4. Иммуноглобулин расфасован по 2,0 мл (одна коммерческая доза) во флаконы (ампулы) соответствующей вместимости. Флаконы закупорены резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками, ампулы герметично запаяны. Флаконы (ампулы) упакованы в картонные (пластиковые) коробки или блистеры (по 10 флаконов в каждую). В каждую коробку вложена инструкция по применению препарата.

5. Препарат хранят и транспортируют в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 10°C.

6. Иммуноглобулин следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Флаконы с иммуноглобулином, содержащие постороннюю примесь, не разбивающийся при взбалтывании осадок, с нарушенной закупоркой, а также остатки иммуноглобулина, не использованные в день вскрытия флаконов, выбраковывают и обезвреживают путем кипячения в течение 15 мин с последующей утилизацией. Утилизация обезвреженного иммуноглобулина не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Препарат отпускается без рецепта

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. ГЛОБКАН-5 – иммунопрофилактический и терапевтический лекарственный препарат

10. Иммуноглобулин поливалентный ГЛОБКАН-5 при введении собакам с профилактической целью обеспечивает пассивный иммунитет против чумы, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и аденовирусных инфекций, который сохраняется в течение 2 недель. Иммуноглобулин обладает лечебными свойствами, максимально проявляющимися в инкубационном и продромальном периодах инфекционного процесса.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. ГЛОБКАН-5 применяют для профилактики и лечения чумы плотоядных, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и аденовирусных инфекций собак.

12. Запрещено вводить иммуноглобулин собакам, больным и ослабленным с клиническими признаками других инфекционных болезней.

13. Иммуноглобулин вводят подкожно или внутримышечно, соблюдая общепринятые правила асептики, для инъекции используют только стерильные материалы и инструменты. Для каждого животного используют отдельную иглу.

Для профилактики указанных вирусных болезней животным массой до 5 кг вводят по 2,0 мл, свыше 5 кг – по 4,0 мл препарата.

С лечебной целью ГЛОБКАН-5 вводят в указанных дозах 1-3 раза с интервалом 12-24 часа, в зависимости от тяжести патологического процесса. Наибольший терапевтический эффект достигается при использовании его в начальной стадии болезни.

14. Случаев передозировки при применении ГЛОБКАНА-5 не установлено.

15. При введении иммуноглобулина у отдельных собак может наблюдаться незначительное повышение температуры и аллергические реакции. Для исключения указанных явлений рекомендуется за 10-15 мин до применения препарата ГЛОБКАН-5 ввести животному парентерально один из антигистаминных препаратов (димедрол, супрастин, тавегил, дипразин и т.д.).

16. Допускается применение иммуноглобулина ценным и лактирующим сукам и щенкам до 6-ти недельного возраста с осторожностью.

17. Следует избегать нарушений схемы применения иммуноглобулина, поскольку это может привести к снижению профилактического и лечебного эффекта.

18. При применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не отмечается.

19. Иммуноглобулин можно применять в комплексе с антибиотиками, сульфаниламидами, пробиотиками и другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения. Иммуноглобулин не применяют в одном шприце с другими биопрепаратами и лекарственными средствами.

20. Сроки возможного использования продукции животного происхождения после введения иммуноглобулина ГЛОБКАН-5 не устанавливаются.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

22. Все лица, участвующие в проведении работы должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки). В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

23. При попадании препарата на кожу и/или слизистые оболочки их рекомендуется промыть большим количеством водопроводной воды. При случайном введении препарата человеку место введения необходимо обработать 70%-ным раствором этилового спирта, обратиться в медицинское учреждение и сообщить об этом врачу.

Наименование и адрес производственной площадки производителя иммуноглобулина поливалентного против чумы плотоядных, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и аденовирусных инфекций собак «ГЛОБКАН-5»: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО «Ветбиохим», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 16.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению иммуноглобулина поливалентного против чумы плотоядных, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и аденовирусных инфекций собак «ГЛОБКАН-5», утвержденная Россельхознадзором 14 февраля 2014 г.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФБГУ «ВГНКИ»