



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ  
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Учетная серия 826-2-5.14-8059      Регистрационный № ПВИ-2-1.8/02474

от 13 марта 2020 года      срок действия до бессрочно  
[дата]      [дата]

Настоящее свидетельство выдано организации-производителю  
[заявитель]

«ADM Protexin® Ltd.», Великобритания

о том, что в соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации  
«О ветеринарии»

Про-Колин+

[полное название кормовой добавки для животных]

в виде пасты

[форма]

применяется для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и  
стимуляции обменных процессов у собак и кошек

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместитель Руководителя

Россельхознадзора  
[должность]



К.А. Савенков  
[И.О. Фамилия]



САВЕНКОВ К.А.  
13 МАР 2020

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по применению Про-Колин+  
для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта  
и стимуляции обменных процессов у собак и кошек

(организация-производитель фирма «ADM Protexin® Ltd.» /  
«АДМ Протексин Лтд.», Великобритания)

**I. Общие сведения**

1. Про-Колин+ (Pro-Kolin+) – пробиотическая кормовая добавка для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и стимуляции обменных процессов у собак и кошек.

2. Про-Колин+ состоит из микробной массы живых бактерий *Enterococcus faecium*, соевого масла - 42,6 - 47,0%, каолина - 30,9 - 34,1%, фруктоолигосахарида - 4,8 - 5,3%, арабиногалактана - 7,0 - 7,8%, пектина - 6,8 - 7,1%, ароматизатора со вкусом говядины (идентичный натуральному) - 0,09 - 0,1%. В 1 см<sup>3</sup> кормовой добавки содержится не менее 2,0 x 10<sup>8</sup> КОЕ (колониеобразующих единиц) бактерий *Enterococcus faecium* NCIMB 10415.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных организмов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в Российской Федерации.

3. По внешнему виду Про-Колин+ представляет собой гомогенную пасту светлорычжевого цвета, без запаха, нерастворимую в воде.

4. Выпускают добавку расфасованной по 15, 30 и 60 мл в калиброванные полимерные тубусы с дозатором, упакованные в картонные коробки поштучно.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и торгового знака, наименования, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантируемых показателей, срока и условий хранения, даты изготовления, массы нетто, номера партии, сведений о подтверждении соответствия, номера государственной регистрации, надписи: «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в упаковке организации-производителя в хорошо вентилируемом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5<sup>0</sup>С до 20<sup>0</sup>С и относительной влажности не более 65%.

Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Запрещается использовать Про-Колин+ по истечении срока хранения.

**II. Биологические свойства**

5. Действие кормовой добавки Про-Колин+ основано на комбинации ее компонентов. Штамм *Enterococcus faecium*, входящий в состав кормовой добавки, нормализует микрофлору желудочно-кишечного тракта животных за счет конкурентного исключения условно-патогенных бактерий, нормализует процесс пищеварения. Каолин является естественным связывающим агентом, обладающим абсорбирующими свойствами. Действующие вещества кормовой добавки способствуют нормализации

моторных процессов, активизации процессов пищеварения, улучшают физиологическое состояние организма.

### III. Порядок применения

6. Про-Колин+ применяют для нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и стимуляции обменных процессов у собак и кошек.

7. Про-Колин+ назначают перорально, 2 - 3 раза в день, в течение от 8 дней до месяца в рекомендуемых ниже дозах:

- кошкам – 1 – 2 мл/гол.

- котяткам – 1 – 2 мл/гол.

- собакам – 2 – 5 мл/гол.

- щенкам – 1 – 2 мл/гол.

8. Побочных явлений и осложнений при применении пробиотической кормовой добавки в рекомендуемых дозах не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено.

9. Про-Колин+ совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

Рекомендации при приеме в сочетании с антибиотиками - через 2 часа после введения дозы антибиотика, т.к. антибиотики могут снизить жизнеспособность и, следовательно, эффективность пробиотических микроорганизмов. Эффективность антибиотика в этом случае останется неизменной.

### IV. Меры личной профилактики

10. При работе с Про-Колин+ следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных.

11. Хранить в местах, недоступных для детей.

Наименование и адрес организации-разработчика: «ADM Protexin® Ltd.», United Kingdom, Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH.

Наименование и адрес организации-производителя: «ADM Protexin® Ltd.», United Kingdom, Lopen Head, South Petherton, Somerset, TA13 5JH.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки Протексин Про-Колин+, утвержденная Россельхознадзором 23 июня 2014 г.

Регистрационный номер ПВИ-2-1.8/02474