

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ВЛАСОВ Н.А.
01 СЕН 2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «Лакто Топ» для нормализации минерального обмена веществ и повышения молочной продуктивности лактирующих коров

(организация-производитель: ООО НПО «Уралбиовет», г. Екатеринбург)

I. Общие сведения

1. «Лакто Топ» («Lacto Top») – добавка кормовая для нормализации минерального обмена веществ и повышения молочной продуктивности лактирующих коров.
2. В единице фасовки (490 г) добавки содержится: калия хлорида - не менее 115 г, натрия хлорида - не менее 109 г, кальция хлорида - не менее 45 г, натрия фосфата однозамещенного - не менее 59 г, магния хлористого - не менее 40 г, вспомогательного вещества сорбита - до 490 г.

В 490 г добавки содержится натрия - 63,0 - 77,0 г, калия - 56,7 - 69,3 г, кальция - 22,5 - 27,5 г, фосфора - 9,0 - 11,0 г, магния - 5,1 - 6,3 г.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. По внешнему виду представляет собой сыпучий порошок от белого до кремового цвета.
4. Выпускают расфасованным по 490 г в пакеты из полимерных и комбинированных материалов.

Каждую единицу фасовки маркируют этикеткой на русском языке с указанием: наименования организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, даты изготовления, номера партии, массы нетто, срока и условий хранения, стандарта организации, номера государственной регистрации, информации о соответствии, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в закрытой упаковке производителя в хорошо вентилируемом, сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5°C до 25°C.

Срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Не применять по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Биологические свойства «Лакто Топ» обусловлены входящими в состав компонентами. В период лактации на синтез молока расходуется большое количество минеральных веществ. Добавка удовлетворяет потребности коров в период раздоя в минеральных веществах, способствует лучшему перевариванию и усвоению питательных компонентов корма.

Применение добавки нормализует минеральный обмен веществ и повышает молочную продуктивность коров.

III. Порядок применения

6. «Лакто Топ» применяют для нормализации минерального обмена веществ и повышения молочной продуктивности лактирующих коров.
7. «Лакто Топ» применяют в хозяйствах индивидуальным способом коровам в период раздоя.

Вводят животным руминаторно посредством специального дозирующего устройства или зонда в течение 3 дней ежедневно в дозе 490 г (одна упаковка) на голову, растворив предварительно в 30 - 40 л теплой питьевой воды (30 - 40°C).

Для растворения необходимо использовать пластиковую тару.

9. «Лакто Топ» совместим со всеми ингредиентами кормов, лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

10. Противопоказаний при применении добавки в соответствии с инструкцией по применению не выявлено. Побочных явлений и осложнений не установлено.

11. Продукцию от коров после применения добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с «Лакто Топом» необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками.

13. Хранить в местах, недоступных для детей.

Инструкция разработана ООО НПО «Уралбиовет» (г. Екатеринбург).

Адрес организации-производителя: ООО НПО «Уралбиовет», 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ»

Регистрационный номер ПВР-2-11.17/03379