

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ

18.12.2019

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
Чистотел зооспрей (Chistotel zoospray)

(Организация-разработчик: АО «НПФ «Экопром»; 140070, Московская обл.,
г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-9.16-3351 №ПВР-3-2.1/00730

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Чистотел зооспрей.

Международное непатентованное наименование: перметрин.

2. Лекарственная форма: раствор для наружного применения.

Чистотел зооспрей содержит в качестве действующего вещества перметрин – 0,35 %, а в качестве вспомогательных веществ ПЭГ-40, глицерин и спирт изопропиловый.

3. Препарат представляет собой прозрачную бесцветную или светло-желтого цвета жидкость.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства. Запрещается применение препарата по истечении срока годности.

4. Выпускают Чистотел зооспрей расфасованным по 100 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости с навинчивающимися распылительными головками, упакованные поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией по применению, и по 200 мл в полимерные флаконы соответствующей вместимости с навинчивающимися пластмассовыми крышками, снабженными насадками-дозаторами, каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, при температуре от 0°C до 30°C.

6. Препарат следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Чистотел зооспрей относится к инсектоакарицидным лекарственным средствам.

10. Входящий в состав препарата перметрин обладает выраженным контактным инсектицидным и акарицидным действием, активен в отношении имагинальных и личиночных фаз развития вшей, блох и власоедов, иксодовых и саркоптoidных клещей, паразитирующих на собаках, кошках и декоративных кроликах. Механизм его действия заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что вызывает нарушение координации движений, паралич и гибель эктопаразитов.

После нанесения препарата на кожно-волосяной покров его активный компонент практически не всасывается в системный кровоток, накапливается в шерсти, эпидермисе, волосяных луковицах и сальных железах, оказывает длительное инсектоакарицидное действие.

Чистотел зооспрей по степени воздействия на организм животных относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). В рекомендуемых дозах не оказывает резорбтивно-токсического, местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия; при попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Токсичен для рыб и пчел.

III. Порядок применения

11. Чистотел зооспрей применяют для уничтожения иксодовых и чесоточных клещей, блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках, кошках и декоративных кроликах, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Препарат не следует применять больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, а также препарат запрещено применять животным с перфорированными барабанными перепонками.

13. При работе с Чистотел зооспрейем следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. В течение 2 - 3 дней после обработки животное не следует гладить, купать и подпускать к маленьким детям. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Чистотел зооспрейем. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку). Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

14. Препарат не следует применять щенкам, котятам, крольчатам моложе 10-недельного возраста, беременным и кормящим самкам.

15. Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении при открытых окнах (форточках), вдали от открытого огня, предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.

Для предотвращения слизывания Чистотел зооспрей после обработки животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы.

Перед использованием флакон с препаратом встрихивают, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, направляя факел аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 15 - 20 см.

Доза препарата в зависимости от массы и состояния шерстного покрова составляет 3 - 6 мл на кошку и собаку, для декоративных кроликов доза препарата в зависимости от заболевания составляет 0,2 – 1,0 мл на животное. Одно нажатие на распылительную головку флакона 100 мл обеспечивает дозу препарата, равную 0,1 мл.

Для уничтожения вшей, блох, власоедов и предотвращения прикрепления иксодовых клещей, спреем обрабатывают все тело животного против роста шерсти, слегка увлажняя ее (у животных длинношерстных пород шерсть приподнимают рукой). Прикрыв глаза животного, обрабатывают ушные раковины и грудь, кончиками пальцев (в перчатке) Чистотел зооспрей слегка втирают вокруг глаз и носа.

Повторные обработки проводят по показаниям, но не чаще 1 раза в 10 дней.

Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного Чистотел зооспрей наносят на клеща и место его прикрепления к коже (одно нажатие на распылительную головку). Если в течение 20 минут клещ самопроизвольно не отпадает, его аккуратно вытаскивают пинцетом и уничтожают.

При поражении саркоптозом собак, кроликов, нотоэдрозом кошек Чистотел зооспрей наносят на предварительно очищенные от струпьев пораженные участки тела с захватом пограничной здоровой кожи до 1 см. Обработку проводят 3 - 5 раз с интервалом 7 - 10 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований. Животных с обширными участками поражения обрабатывают в 2 приема с интервалом 1 день, нанося препарат на пораженные места сначала одной, а затем другой половины тела.

Лечение животных рекомендуется проводить комплексно с применением патогенетических и симптоматических лекарственных средств.

При отодектозе животных, псороптозе кроликов наружный слуховой проход очищают от струпьев и корок, затем, направляя факел аэрозоля на внутреннюю поверхность ушной раковины, осуществляют 1 - 2 (в зависимости от размера животного) нажатия на распылительную головку, нанося 0,1 - 0,2 мл препарата, после этого складывают ушную раковину вдоль пополам и массируют ее основание. Обработку повторяют 2 - 3 раза с интервалом 5 - 7 дней. Обрабатывают обязательно оба уха, даже в случае поражения только одного уха. При необходимости курс лечения повторяют. При отодектозе, псороптозе, осложненных отитом, назначают антибактериальные и противовоспалительные средства в соответствии с инструкциями по применению.

До полного высыхания шерстного покрова после обработки не следует позволять животным слизывать препарат, допускать их к открытому огню и нагревательным приборам.

В целях уничтожения эктопаразитов в помещении и предотвращения повторной инфestation животных будки, клетки, подстилки и попоны

обрабатывают Чистотел зооспреем из расчета 2 мл на 1 м² обрабатываемой поверхности. Одно нажатие на распылительную головку флакона объемом 200 мл обеспечивает дозу препарата, равную 0,5 мл.

В течение 3 дней не допускают контакта животного с обработанными предметами, а перед последующим использованием их моют (стирают) с моющим средством.

16. Побочных явлений и осложнений при применении Чистотел зооспрея в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении побочных явлений (избыточное слюноотделение, слезотечение, мышечная дрожь, раздражение кожи), обработки прекращают, препарат смывают водой с моющим средством и при необходимости проводят десенсибилизирующую терапию.

17. При передозировке у животного может наблюдаться избыточное слюноотделение, мышечная дрожь, рвота. В этом случае препарат тщательно смывают водой и животному назначают средства симптоматической терапии.

18. Чистотел зооспрей не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами для обработки животных.

19. Особеностей действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной обработки ее проводят в той же дозе по той же схеме.

21. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Чистотел зооспрея, согласованная Россельхознадзором 09.08.2016 года.

Наименование производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23.

АО «Научно-производственная фирма «Экопром»; Московская обл., г. Люберцы, р.п. Томилино, ул. Гаршина, д. 11/23, пом. 263.

Генеральный директор
АО «НПФ «Экопром»

В.В. Шаталов

